

UTI (Arabic)

التهاب الجهاز البولي (UTI)



التهاب الجهاز البولي (UTI) هو التهاب بكتيري في مجرى البول (أنبوب يساعد على إخراج البول من الجسم) أو المثانة أو الكلى. يعد التهاب الجهاز البولي أكثر شيوعًا عند الأطفال دون سن 12 شهرًا، وخاصة الفتيات. تحدث بسبب البكتيريا التي تدخل الجسم وتنتقل عبر الجهاز البولي.

العلامات والأعراض

لسع أو حرقان عند التبول
الذهاب إلى المرحاض أكثر من المعتاد



بول كريه الرائحة



ألم في البطن أو الظهر



قد يعاني الأطفال المصابون بالتهاب الجهاز البولي بالحمى، قيء، عدم استقرار، قلة الطعام، أو خفت في لون البشرة أكثر من المعتاد.

العلاج

يتم علاج التهاب الجهاز البولي بالمضادات الحيوية التي يمكن تناولها في المنزل غالبًا.

العلاج المبكر هو الأفضل. إذا اشتبه الطبيب في إصابة طفلك بالتهاب الجهاز البولي، سينصحونهم بتناول المضادات الحيوية بمجرد جمع عينة للاختبار. يمكن تغيير المضادات الحيوية عندما تعود النتائج من المختبر.

إذا كان عمر طفلك أقل من 3 أشهر أو كان مريضًا جدًا، فقد يتم إدخاله إلى المستشفى لتلقي المضادات الحيوية من خلال التنقيط (عن طريق الوريد).

عادة ما تكون هناك حاجة للمضادات الحيوية لمدة 3 إلى 5 أيام. قد يستغرق تحسن الأعراض من يوم إلى يومين.

قد يساعد الباراسيتامول (بانادول) أو الإيبوبروفين (نوروفين) في علاج الأعراض. اتبع التعليمات الموجودة على العبوة أو الزجاجة لمعرفة الجرعة الصحيحة لطفلك.

قد تساعد أكياس الأورال (المتوفرة في الصيدليات) المراهقين عند الشعور بأي ألم.



متى يجب أن تقوم بزيارة للطبيب

راجع طبيبك إذا كان طفلك:

- أعراض التهاب الجهاز البولي UTI
- تم تشخيصه بالتهاب الجهاز البولي UTI وهو:
 - لا يتحسن بعد يومين من تناول المضادات الحيوية
 - لديه مشكلة في تناول المضادات الحيوية
 - يتقيأ
 - لا يشرب كمية كافية من السوائل
 - الشعور بالألم الظهر.

سيختبر طبيبك عادة بول طفلك للتأكد من وجود التهاب. سيتم أيضًا إرسال عينة بول إلى المختبر لتأكيد التشخيص ومعرفة المضادات الحيوية الأفضل لعلاج الالتهاب.

قد تكون هناك حاجة لمزيد من الفحوصات إذا كان طفلك مريضًا جدًا أو صغيرًا جدًا أو يعاني من الكثير من التهابات الجهاز البولي. سيناقدش طبيبك هذا الأمر معك، إذا لزم الأمر.

منع التهاب الجهاز البولي

للمساعدة في منع الإصابة بالتهاب أكر، فأنت بحاجة إلى:

- تأكد من أن طفلك غير مصاب بالإمساك
- تأكد من أن طفلك يشرب كمية كافية من السوائل حتى يصبح لون البول صافياً وفتح اللون
- - تعليم الفتيات المسح من الأمام إلى الخلف عند الذهاب إلى المراض وارتداء ملابس داخلية قماشية تسمح بمرور الهواء (غير صناعية).

تم إعداده من قبل قسم الطوارئ، مستشفى كوينزلاند للأطفال. نعتف بمساهمة المستهلكين ومقدمي الرعاية.

Resource ID: FS348 Reviewed: July 2022

إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذه المعلومات من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية كدليل إرشادي فقط ويهدف إلى دعم المناقشة مع طبيب طفلك أو أخصائي الرعاية الصحية، وليس استبداله. يتم تحديث المعلومات بانتظام، لذا يرجى التحقق من أنك ترجع إلى أحدث إصدار. اطلب المشورة الطبية، حسب اقتضاء المخاوف المتعلقة بصحة طفلك.