

أيمكن أن يكون هذا تعفن الدم



عفونة الدم هي حالة طبية طارئة وتحتاج إلى علاج فوري.

يحدث تعفن الدم عندما يصدر الجسم رد فعل شديد ضد العدوى فيبدأ بالحاق الضرر بأنسجته وأعضائه، ويمكن أن يؤدي تعفن الدم إلى إتلاف أجزاء عديدة من الجسد ويمكن أن تؤدي أيضاً إلى الوفاة، وأفضل فرصة للشفاء من تعفن الدم هي سرعة العلاج.

قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان طفلك يعاني من تعفن في الدم؛ لأن العديد من أعراضه في البداية مشابهة لأعراض العدوات الخفيفة. الفرق هو أن الأعراض مع تعفن الدم لا تتحسن، بل قد تزداد سوءاً.

تعفن الدم نادر الحدوث، ولكن من الممكن أن يصاب به أي طفل، ونحن جميعاً بحاجة لمعرفة العلامات التي يجب أن ننتبه لها.

لا أحد يعرف طفلك مثلك؛ لذا ثق بحدسك. إذا كان طفلك مريضاً أكثر من أي وقت مضى أو كان مرضه هذه المرة مختلفاً عن المرات السابقة - فاسأل طبيبك أو ممرضتك "هل يمكن أن يكون هذا تعفنًا في الدم؟"

أي عَرَض واحد من هذه الأعراض قد يعني أن طفلك مريض جداً ويمكن أن يكون مصاباً بتعفن الدم:



قائمة فحص تعفن الدم عند الأطفال

إذا كنت ترى أن طفلك لا يتحسن، أو أن حالته تزداد سوءاً، فثق في حدسك. ضع علامة في المربعات التي تنطبق على أعراض طفلك واسأل طبيبك أو ممرضتك "هل يمكن أن يكون تعفنًا في الدم؟"

درجة الحرارة



- يرتعد أو يرتجف من الحمى
- درجة حرارته منخفضة (أقل من 36 درجة مئوية)
- ارتفاع درجة الحرارة (أكثر من 38 درجة مئوية) لمدة 5 أيام أو أكثر عند الأطفال الأكبر من 3 شهور
- أي ارتفاع في درجة الحرارة يتخطى 38 درجة مئوية عند الرضع من سن 3 شهور أو أقل

الألم



- صداع أو آلام بالرقبة أو العضلات أو الصدر أو العظام أو المفاصل دون سبب واضح
- مسكنات الألم لا تجدي

البشرة



- برودة اليدين والقدمين
- ألم عند لمس البشرة
- احمرار فاقع في بشرة الجسد بالكامل
- طفح جلدي

التنفس



- نخير من الفم عند الطفل وهو مستيقظ
- صعوبة في التنفس: شفت في المنطقة تحت الأضلاع أو ظهور مكان غائبين عظام القفص الصدري
- ضيق فتحتي الأنف واتساعهما مع كل نفس
- أصوات طفقة من الصدر

الحمّام



- لا تبوّل أو بلل في الحفاضات لمدة 12 ساعة أو أكثر
- انخفاض عدد الحفاضات المستخدمة، وتكون أخف من المعتاد
- دم في البراز
- أكثر من 5 مرات إسهال مائي (سيلان البراز) في خلال 24 ساعة

النشاط والحركة



- لا يستطيع التركيز
- لا يستطيع البقاء مستيقظاً
- فقدان الشغف باللعب
- لا يعبأ بما يحدث من حوله
- سريع الانفعال
- التَّمَلُّل
- غير قادر على المشي أو يرفضه
- لا يستخدم الذراع أو الساق أو اليد أو القدم دون سبب واضح
- الشعور بتوعك أكثر من ذي قبل

الأكل والشرب



- عدم القدرة على الاحتفاظ بأي سوائل بسبب القيء
- قيء أخضر أو أسود أو به دم
- عدم الاهتمام بالشرب أو الأكل
- عطش شديد
- جفاف الفم أو الشفتين أو اللسان

المرض قد يتغير - ثق في حدسك حتى لو زار طفلك الطبيب مؤخراً، وكنت تعتقد أنه قد يكون مصاباً بتعفن الدم، فعد إلى المستشفى واسأل "هل يمكن أن يكون هذا تعفنًا في الدم؟"

تفضلوا بزيارة: www.childrens.health.qld.gov.au/Sepsis

