


Scarlet Fever (Arabic)


# الحمى القرمزية عند الأطفال





الحمى القرمزية هي عدوى بكتيرية يمكن أن تسبب التهاب الحلق وطفح جلدي في بعض الأحيان. تظهر الأعراض عندما تفرز البكتيريا سمومًا تنتشر في مجرى الدم.


## العلامات والأعراض


- 


حمى
- 


أحمرار، والتهاب الحلق
- 

طفح جلدي يبدأ في الرأس والرقبة وينتشر في الجسم والذراعين والساقين. يظهر في غضون 24-48 ساعة ويتلاشى في غضون 3-4 أيام.
- 

تبدو البشرة خشنة، مثل ورق المرمل. قد يتقشر (مثل حروق الشمس) عندما يتلاشى الطفح الجلدي، وغالبًا ما يحدث على اليدين أو القدمين أو في مناطق الحفاض أو الفخذ.
- 

تبدو البشرة حمراء مع بقع حمراء تتحول إلى اللون الأبيض عند الضغط عليها
- 

لسان أحمر مع نتوءات، قد يكون له مظهر يشبه الفراولة
- 

بقع بيضاء في مؤخرة الحلق
- 

تورم الغدد الليمفاوية في الرقبة

## العلاج

يتم تشخيص الحمى القرمزية من قبل طبيب عام بعد الفحص البدني. قد يأخذ الطبيب مسحة من الحلق للاختبار ويخبرك إذا كانت هناك حاجة لمزيد من الاختبارات.

تُعالج الحمى القرمزية بمضادات حيوية من البنسلين (أقراص تؤخذ عن طريق الفم) لمدة 10 أيام. قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 48 ساعة حتى تتحسن الأعراض.

إذا تركت الحمى القرمزية دون علاج، يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة مثل الحمى الروماتيزمية الحادة - مرض يمكن أن يؤثر على القلب والمفاصل والدماغ والجلد - مما قد يؤدي إلى أمراض القلب الروماتيزمية (تلف القلب). هذه مضاعفات غير شائعة ولكنها خطيرة لذا من المهم لطفلك إنهاء العلاج الموصى به من الطبيب العام.



## الرعاية في المنزل

تأكد من حصول طفلك على قسط كبير من الراحة ومنحه الباراسيتامول (بانادول أو ديمادون) وإيبوبروفين (نوروفين) للمساعدة في إدارة أي ألم أو حمى. اتبع التعليمات الموجودة على الزجاجة أو العبوة لمعرفة الجرعة الصحيحة. لا تعط أكثر مما ينصح به في اليوم. قدم لطفلك مشروبات سكرية مثل العصير أو الحليب أو الإلكتتروليتات (متوفرة لدى الصيدلي المحلي). إذا كان طفلك يشرب ما يكفي، فسيكون لون بوله أصفر فاتح.

سيحتاج طفلك لبدء تناول المضادات الحيوية لأكثر من يومين قبل العودة إلى المدرسة أو رعاية الأطفال. عندما يشعرون أنهم بصحة جيدة، يمكنهم العودة إلى المدرسة أو رعاية الأطفال.

من المهم غسل يديك / يدي طفلك وأي شيء يستخدمه طفلك في الأكل والشرب لمنع انتشار العدوى.

للحصول على استشارة طبية غير عاجلة، اتصل على 13HEALTH (13 43 25 84) للتحدث إلى ممرضة مسجلة على مدار 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع مقابل تكلفة مكالمات محلية.

اطلب الاستعانة بمترجم إذا كنت بحاجة لهذه الخدمة.



## متى يجب أن تقوم بزيارة للطبيب

راجع طبيبك إذا كان طفلك:

- يتألم، على الرغم من تناوله الباراسيتامول أو الإيبوبروفين
- لا يريد أن يشرب أي شيء
- لا يتبول كثيراً
- لا يتحسن.

تم إعداده من قبل قسم الطوارئ، مستشفى كوينزلاند للأطفال. نعتز بمساهمة المستهلكين ومقدمي الرعاية.

Resource ID: FS355. Reviewed: July 2022

إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذه المعلومات من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية كدليل إرشادي فقط ويهدف إلى دعم المناقشة مع طبيب طفلك أو أخصائي الرعاية الصحية، وليس استبداله. يتم تحديث المعلومات بانتظام، لذا يرجى التحقق من أنك ترجع إلى أحدث إصدار. اطلب المشورة الطبية، حسب اقتضاء المخاوف المتعلقة بصحة طفلك.